

RECOMENDACIONES

VACUNACIÓN

ESTRATEGIA EN PERSONAS EN SITUACIÓN DE INUNDACIÓN

- **ANTIGRI PAL NIÑOS:** ENTRE LOS 6 Y LOS 35 MESES: CORRESPONDEN 2 DOSIS DE 0,25 ML, CON UN INTERVALO DE 30 DÍAS ENTRE AMBAS DOSIS
- **ANTIGRI PAL ADULTOS:** A PARTIR DE LOS 3 AÑOS CORRESPONDE UNA DOSIS DE 0.5 ML SE APLICA A TODOS LOS AFECTADOS POR LA INUNDACIÓN.
EMBARAZADAS: EN CUALQUIER TRIMESTRE DEL EMBARAZO
- **HEPATITIS A :** SEGÚN CALENDARIO A LOS 12 MESES DE EDAD
ENTRE LOS 9 Y 15 AÑOS APLICAR UNA DOSIS ÚNICA DE 720 U
MAYORES DE 15 AÑOS APLICAR UNA DOSIS ÚNICA DE 1440 U A HUÉSPEDES ESPECIALES (ver Recomendaciones Nacionales de Vacunación)
- **NEUMOCÓCCICA 13 (PREVENAR):** SEGÚN CALENDARIO 2 m, 4 m, 12 m (PREVENAR)
- **NEUMOCÓCCICA 23:** ADULTOS DE 65 AÑOS Ó MÁS QUE NO HAYAN RECIBIDO UNA DOSIS PREVIA O ADULTOS DE OTRAS EDADES CON FACTORES DE RIESGO
- **DOBLE BACTERIANA:** (ANTITETÁNICA – ANTIDIFTÉRICA) LA DOSIS ES DE 0.5 ML (NIÑOS O ADULTOS), EL FRASCO TIENE 10 DOSIS.
EN CASO DE HERIDAS SUCIAS CON ANTECEDENTE VACUNAL MAYOR A 5 AÑOS SE INDICA 1 DOSIS DE REFUERZO, MÁS DE 10 AÑOS DE LA ÚLTIMA DOSIS SE INDICA ESQUEMA BÁSICO: 1 DOSIS Y REFUERZO A LOS 30 DÍAS. **SIN HISTORIA VACUNAL:** 1 DOSIS INICIAL (+ GAMMAGLOBULINA), 2da. DOSIS A LOS 30 DÍAS Y 3ra DOSIS AL AÑO DE LA 1RA.

REGISTRAR LAS DOSIS APLICADAS CON: NOMBRE, APELLIDO, EDAD, DOMICILIO, DOCUMENTO (en caso que lo tenga o lo recuerde) , VACUNA Y/O VACUNAS APLICADAS,LOTE.